

# News Release

 日本ジェネリック株式会社

2023年12月13日

日本ジェネリック株式会社

各位

免疫抑制剤  
日本薬局方 **タクロリムスカプセル**  
**タクロリムスカプセル0.5mg「JG」**  
**タクロリムスカプセル1mg「JG」**  
「効能又は効果」「用法及び用量」追加承認に関するお知らせ

日本ジェネリック株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:井上祐弘)の標記 2 製品に関して、下記のとおり、「効能又は効果」「用法及び用量」追加が、12月13日付で承認されましたので、ご案内申し上げます。

今後も引き続き、弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

## 記

### 【製品名】

タクロリムスカプセル 0.5mg「JG」、同 1mg「JG」

### 【効能又は効果】

- 下記の臓器移植における拒絶反応の抑制  
腎移植、肝移植、心移植、肺移植、脾移植、小腸移植
- 骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制
- 重症筋無力症
- 関節リウマチ(既存治療で効果不十分な場合に限る)
- ループス腎炎(ステロイド剤の投与が効果不十分、又は副作用により困難な場合)
- 難治性(ステロイド抵抗性、ステロイド依存性)の活動期潰瘍性大腸炎(中等症～重症に限る)
- 多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎

### 【用法及び用量】

〈腎移植の場合〉～〈潰瘍性大腸炎の場合〉〈変更なし〉

〈多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎の場合〉

通常、成人には、初期にはタクロリムスとして1回0.0375mg/kgを1日2回朝食後及び夕食後に経口投与する。以後、目標血中トラフ濃度を5～10ng/mLとし、血中トラフ濃度をモニタリングしながら投与量を調節する。

<備考>このたび、下線部が追加となりました。これに伴い、「使用上の注意」も改訂しております。

### 【本ニュースリリースのお問い合わせ先】

日本ジェネリック株式会社 お客様相談室

TEL: 0120-893-170

E-Mail: [jgweb@nihon-generic.co.jp](mailto:jgweb@nihon-generic.co.jp)

※本リリースは本町記者会でも同時に発表しております。

弊社のホームページにも掲載しております。  
<https://www.nihon-generic.co.jp/>