

医薬品を正しく購入するための

説明文書


第1類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 名称 | ミノキシジルローション 5%「JG」 |
| 2 | 成分・分量 | 100mL 中 ミノキシジル 5g |
| 3 | 用法・用量 | 成人男性（20歳以上）が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。 |
| 4 | 効能・効果 | 壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。 |
| 5 | 保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項 | 1. 次の人は使用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) 女性。 (3) 20歳未満の人。 (4) 壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。 (5) 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。 2. 次の部位には使用しないでください (1) 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。 (2) きず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある頭皮。 3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤（軟膏、液剤等）の頭皮への使用は、避けてください。又、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。 4. 次に該当する人はお申し出ください (1) 今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。 (2) 高血圧の人、低血圧の人。 (3) 心臓又は腎臓に障害のある人。 (4) むくみのある人。 (5) 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。 (6) 高齢者（65歳以上）。 (7) 次の診断を受けている人。 甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）。 |
| 6 | 薬剤師が 必要と判断 する事項 | －ご使用にあたって－ お使いになる方の髪質や1ヵ所への集中塗布などにより、ごわつき感が出たり、くし通りが悪くなったり、部分的に白くなる（成分の結晶化）ことがあります。毎日洗髪を行い、頭皮を清潔にして、用法・用量を守ってお使いください。 |

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用後、体調に変化等があった場合（副作用等）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。

販売元
 日本ジェネリック株式会社
東京都港区芝五丁目33番11号

製造販売元
 シオノケミカル株式会社
東京都中央区八重洲2丁目10番10号

MINOX-M2-2JG
2024年9月改訂